

30.8.2018

## OHUTSUOLEN MAGNEETTITUTKIMUS

Olette saaneet lähetteen ohutsuolen magneettitutkimukseen. Tutustukaa potilasohjeeseen **MAGNEETTITUTKIMUS (MRI)** jo etukäteen ja vastatkaa siinä oleviin kysymyksiin. **Ottakaa täytetty esitietolomake mukaan tutkimukseen.**

Pyydämme teitä saapumaan tutkimusyksikköön 45 minuuttia ennen teille varattua tutkimusaikaa. Kuvaus kestää 30-60 minuuttia. Magneettiyksikössä kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia aikatauluun. Varatkaa aikaa tutkimuksessa käyntiin 2 tuntia.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Rautatabletti lääkitys on lopetettava 5 päivää ennen kuvausta.

### KAKSI PÄIVÄÄ ENNEN TUTKIMUSTA

Aloittakaa vähäkuituinen ruokavalio - välttäkää siemeniä sisältäviä hedelmiä ja marjoja, tomaatteja, leseitä, pellavansiemeniä ja pähkinöitä. Vähäkuituisia ruokia ovat esim. peruna, soseutetut kasvikset, siivilöidyt mehut, keitot ja kiisselit, jauhopuurot ja vellit, nestemäiset maitotuotteet, juustot, jäätelö, liha, kala, leikkeleet, muna, kala- ja kasvisliemet, leipä (ei kuitenkaan tuore leipä tai pulla, eikä kokojyvätuotteet). Syökää aterioilla tavallista pienempiä annoksia, juokaa runsaasti vettä.

### TUTKIMUSTA EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ

Juokaa runsaasti nesteitä päivän aikana (vähintään 3 litraa), lisäksi saatte syödä vain nestemäisiä vähäkuituisia ruokia

- klo 16:00 ottakaa 2 Toilax tablettia (tai vastaava) runsaan veden kera (tabletit saatte apteekista)
- klo 19:00 laittakaa Toilax-pienoisperäruiske (tai vastaava) peräsuoleen (saatte peräruiskeen myös apteekista, huom. 2 kpl)

### TUTKIMUSPÄIVÄN AAMUNA

Olkaa 4 tuntia ennen tutkimusta ravinnotta. Lääkärin määräämät lääkkeet voitte ottaa ja lasin vettä. Laittakaa aamulla yksi Toilax-pienoisperäruiske peräsuoleen.

30.8.2018

## Tutkimuksen suorittaminen

Ennen kuvauksen aloittamista röntgenhoitaja ohjeistaa teitä juomaan vettä sekä sorbitolivesiliuosta. Kuvauksen ajan makaatte tutkimuspöydällä vatsallaan. Tutkimuksen alussa teille laitetaan suolistoa rentouttavaa lääkettä laskimonsisäisesti. Lisäksi laskimoon annetaan gadoliniumpitoista tehosteainetta. Tutkimuksen aikana saatte hengitysohjeita koneen kautta. Kuvaus kestää noin 30 minuuttia.

## Tutkimuksen jälkihoito

Varautukaa juotavan liuoksen mahdollisiin laksatiivisiin vaikutuksiin. Lisäksi aloittakaa syöminen kevyesti tyhjennyksen jälkeen.

## Lisätiedot

Magneettitutkimuksesta laskutetaan erikoissairaanhoidon maksujen mukaisesti.

Mikäli ette pääse tutkimukseen, pyydämme, että peruutatte varatun ajan mahdollisimman pian, soittamalla teidät tutkimukseen lähettäneeseen yksikköön. Peruuttamattomasta magneettitutkimuksesta veloitetaan erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen mukaisesti. Tutkimuksen tuloksen kuulette teitä hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa yhteyttä hoitavaan yksikköönne, mikäli teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Mahdollisissa tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä, voitte soittaa radiologian yksikköön arkisin klo 8-15 p. 044 417 3534.